tutorat santé bordeaux
Tutorat des Associations Etudiantes soutenu par université BORDEAUX
Préparation aux Concours Médicaux et Paramédicaux
Médecine Pharmacie Maïeutique Odontologie Filières Paramédicales
Kinésithérapie
Ergothérapie
Psychomotricité
Manip. Radio
Podologie

Correction ED2 - UE7b

QCM 1 : ABD

C. FAUX, les cancers sont des maladies **multifactorielles**. Il est très rare qu'un seul facteur soit impliqué.
E. FAUX, c'est le cancer du **sein**.

QCM 2 : BCD

A. FAUX, c'est la définition de la **prévalence**. L'incidence permet de mesurer le risque de cancer et correspond au nombre de nouveaux cas.
E. FAUX, c'est la définition de la **mortalité**. La létalité c'est la proportion de morts parmi les malades.

QCM 3 : DE

A. FAUX, c'est prostate > poumon > côlon-rectum.
B. FAUX, c'est sein > colon-rectum > poumon.
C. FAUX, c'est le cancer du **sein**, le cancer du poumon occupe la deuxième position car en effet les femmes fument de plus en plus.

QCM 4 : BE

A. FAUX, le cancer le plus fréquent dans le monde est celui du **poumon**.
C. FAUX, au contraire ! Le vieillissement de la population dans les pays industrialisés augmente l'incidence des cancers.
D. FAUX, ce n'est pas en France mais dans le monde que le cancer du poumon est le plus fréquent.

QCM 5 : ABDE

C. FAUX, entre 10 et 15% des cancers sont dus à des prédispositions génomiques.

QCM 6 : A

B. FAUX, le tabac est un des facteurs de risque sur lequel on peut agir grâce à des actions de prévention.
C. FAUX, la consommation d'alcool en France est en **diminution** depuis les années 60, mais reste tout de même très élevée.
D. FAUX, malgré la présences des férias dans le Sud, on consomme plus d'alcool dans le Nord (pour se réchauffer surement).
E. FAUX, l'alimentation peut constituer à la fois un facteur de risque (alimentation trop grasse, sucrée ou salée, etc.) et un facteur prévenant l'apparition de certains cancers.

QCM 7 : ABC

D. FAUX, le dépistage dépend de beaucoup de critères comme les traitements disponibles, l'implication des professionnels de santé et des patients, les tests disponibles, etc.

E. FAUX, **1/3** des cancers sont évitables.

QCM 8 : ABD

C. FAUX, on utilise le **taux standardisé sur l'âge**.

E. FAUX, c'est la mortalité qui est stable, l'incidence est croissante.

QCM 9: BDE

A. FAUX, seulement 20% au niveau départemental.

C. FAUX, pas de guérison mais une diminution du risque de cancer.

QCM 10 : BD

A. FAUX, un traumatisme comprend aussi les **troubles** (physiques et psychologiques) qui résultent de l'action violente de l'agent extérieur.

C. FAUX, *Injury* est un terme anglais qui regroupe l'équivalent d'accident, blessure, violence et traumatisme. C'est une définition plus large qu'on ne peut pas traduire par un seul mot français.

E. FAUX, 5 millions de décès par blessure = **9-10%** de tous les décès.

QCM 11 : ABCE

A. VRAI, souffle de l'explosion.

B. VRAI, radiation sonore.

QCM 12 : ABE

C. FAUX, c'est l'inverse le suicide est la 2ème grande cause de décès par traumatisme et la 15ème cause de décès.

D. FAUX, il y a **5 millions de morts/an** les décès par traumatismes.

QCM 13 : ABDE

C. FAUX, pour cette tranche d'âge la première cause de décès par traumatisme est représentée par les accidents de la route.

QCM 14 : ABE

C. FAUX, les hommes risquent plus de mourir par traumatismes ou violence que les femmes.

D. FAUX, 2ème cause de décès par traumatisme = suicide pour les hommes et chutes pour les femmes.

QCM 15 : ACDE

B. FAUX, on remarque que la fréquence des symptômes est plus élevée chez les femmes que chez les hommes.

QCM 16 : ACD

B. FAUX, plus on parle de suicide, plus il y aura de suicide de fans.

E. FAUX, multiplié par **6**.

QCM 17 : ABCD

E. FAUX, c'est de la prévention **secondaire**.

QCM 18 : CE

A. FAUX, **trois** protéines.

B. FAUX, c'est sur les **lymphocytes**.

D. FAUX, c'est l'incidence au niveau **mondial**.

QCM 19 : ADE

B. FAUX, la pandémie est loin d'être contrôlée.
C. FAUX, il a une **augmentation** des nouvelles infections chez les **homosexuels**. Le reste de l'item est vrai.

QCM 20 : ABE

C. FAUX, la sélection du virus résistant se produit lorsque l'observance n'est pas optimale.
D. FAUX, les CD4 doivent être au-dessus de 500/mm^3 voire 750/mm^3 et plus.

QCM 21 : ACD

B. FAUX, c'est un **ARN** simple brin.
E. FAUX, il se lie aux lymphocytes **T4**.

QCM 22 : ABCDE

QCM 23 : AD

B. FAUX, on en compte 6000.
C. FAUX, aucune région n'est épargnée ! Le reste est vrai.
E. FAUX, chez les homosexuels masculins.

QCM 24 : ACE

B. FAUX, c'est l'inverse.
D. FAUX, des traitements existent et en France la situation est telle que le dépistage n'est pas obligatoire mais systématiquement proposé pour toutes les femmes enceintes.

QCM 25 : E

A. FAUX, le principal mode de transmission est sexuel. Mais il est vrai que le taux de transmissions est de 30-45% sans traitement.
B. FAUX, les 3 modes de transmissions sont : sexuelle, sanguin, maternelle.
C. FAUX, sauf si la personne a des blessures à l'intérieur de la bouche.
D. FAUX, c'est le VIH qui est transmissible lors de l'allaitement.

QCM 26 : BC

A. FAUX, le stade SIDA est caractérisé par des maladies opportunistes et des déficiences immunitaires.
D. FAUX, ce sont les **lymphocytes T4**, le reste est vrai.
E. FAUX, le traitement permet une diminution de la mortalité et une augmentation de l'espérance de vie.

QCM 27 : CDE

A. FAUX, selon l'OMS, la santé correspond à un état de complet bien-être physique, mental et social (par cœur les gars).
B. FAUX, l'appréciation est **indirecte** puisque l'on mesure les altérations de la santé.

QCM 28 : AE

B. FAUX, aujourd'hui il existe **encore beaucoup** de besoins de prévention et de soins insatisfaits.
C. FAUX, les femmes ont une espérance de vie **plus élevée** que les hommes.
D. FAUX, il existe bien des moyens préventifs efficaces pour contrer la mortalité infantile, ce qui rend la chose encore plus inacceptable !
E. VRAI, merci les antivax !

QCM 29 : ABE

C. FAUX, elle a un coût **très élevé** !
D. FAUX, c'est une démarche qui est **collective** et non pas individuelle.

QCM 30 : BCD

A. FAUX, les sujets qui risquent d'attraper la grippe sont une population exposée, donc la prévention est **orientée ou sélective**.

E. FAUX, le dépistage fait partie de la prévention **secondaire**, car il concerne une tranche de la population susceptible d'être déjà atteint de la maladie concernée.